మూర్ఛ సమయంలో చేయవలసిన ప్రథమ చికిత్స

మూర్ఛ మొదలైన 5 నిమిషాల లోపు



ప్రశాంతంగా ఉండాలి దుస్తులు వదులు చేయాలి



తల కింద దిండు పెట్టి పక్కకు తిప్పి పడుకోబెట్టాలి



హాని కలిగించే వస్తువుల నుండి దూరంగా ఉంచాలి



నోటిలో ఏవీ పెట్టవద్దు



బలవంతంగా ఆపేందుకు ప్రయత్నించవద్దు



మూర్ఛ ఉన్న సమయాన్ని గమనించండి

5 నిమిషాల తరువాత కూడా మూర్ఛ ఆగకపోతే



మిడాజోలామ్



నాసల్ స్ప్రేను అమర్చాలి



ముక్కులో స్ప్రే చేయాలి

మిడాజోలామ్కు పిల్లలు స్పందించకపోయినా లేదా

- ఏదైనా సందేహంగా ఉన్నప్పుడు
- గాయం జరిగితే
- నోటిలో ఆహారం / ద్రవం / వాంతులు ఉన్నప్పుడు
- నీటిలో మూర్ఛ సంభవించినప్పుడు
- జర్కింగ్ ఆగిన తర్వాత పిల్లవాడికి శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉంటే
- ఒక మూర్ఛ ముగిసిన వెంటనే మరొక మూర్ఛ రావడం
- మూర్ఛ 5 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ సేపు కొనసాగితే



అంబులెన్స్‌కు కాల్ చేయండి లేదా వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లండి

Nayi Disha
inform · connect · empower

మేధో మరియు అభివృద్ధి సంబంధిత లోపాల కోసం సమాచార వనరు

contactus@nayi-disha.org
www.nayi-disha.org
© Copyright 2017